N.o 3.

Procès verbal d'un hydrocelle compliqué de gouflement, de dureté au testicule, au cordon spermatique, d'epaississement à la tunique vaginale et adherence entre une partie de celle ci et le testicule, operé par Mr Verguin Chirurgien-major de la marine, des armées navales, Lieutenant et inspecteur du collège royal de chirurgie à toulon; D'après le resultat d'une consultation entre M.M. barberet premier medecin de la marine, butre Chirurgien aide-major, Manne demonstrateur, Giraud chirurgien ordre attaché à la compagnie de M.M. Les gardes de la marine et Boyer aussi chirurgien ordre attaché au corps Royal de la marine

En 7bre 1783 M. Giraud conduisit chez le chirurgien major M. D'archimbaud garde de la marine atteint d'un gouflement avec dureté, inegalités, douleur au testicule droit et au cordon spermatique, il lui fit le detail des antecedents de la maladie et des moyens qu'il avoit employés.

La conduitte du malade les ayant assurés que la cause de son etat ne dependoit que de deux accidents procedants de cause externe: Le premier fut un gouflement à cette partie produit par une compression que M. Giraud termina par les remedes generaux; Le second en mars 1783 fut une pression très considerable, en tombant sur le banc de quart étant embarqué sur la corvette du Roy la Blonde Commandée par Mr d'Esparre Lieutenant de Vaisseaux. Le dernier accident ne fut pas suivi de tous les secours que la gravité de l'etat demandoit: Quelques resolutifs sans saignées furent employés et le malade fut debarqué dans l'etat cy-dessus. Il fut mis à l'usage des topiques emolients, des purgatifs minoratifs de huit en huit jours, à une cuillerée de Syrop fondant tous les matins et une prise de huit onces de petit lait. Après un mois de traitement, on substitua un emplatre fondant au cataplasme sans discontinuer les autres remedes; Vers les premiers jours de 8bre Le volume du testicule qui dans le principe etoit d'environ cinq pouces de largeur distendu à proportion, fut reduit

à celle

a celle de trois et demi la douleur et les inegalités très diminuées; Mais une ondulation commença a se manif-
-ester à la partie infre de la tumeur, le liquide s'est accrû insensiblement dans la tunique vaginale sans le continuer jusqu'à l'anneau de l'oblique externe. Les remedes cy-devant ont été continués jusques à la mi fevrier et le malade a été operé le onze mars en présence de M. M. les consultants, autres chirurgiens de la marine et de la ville.

L'incision fut faite à la partie antre et latterale externe de la tumeur; c'est sur cette partie que le testicule se trouva adherent à la tunique vaginale; des hydatides se presenterent d'abord à l'ouverture qui fut prolongée haut et bas à la faveur d'une sonde crenellée dans l'intention de mettre cette partie en suppuration, en attendant de suivre les indications que les simptomes presenteroient. Le gonflement, les douleurs, la fievre qui survinrent dans la journée furent combattues par trois saignées, le micopaniy et par les autres antiphlogistiques internes et externes. Le troisième jour il se manifesta une ondulation entre la cloison mediastine du darthos et le testicule. Le 15. la tumeur fut ouverte par une incision de trois pouces qui donna issüe à quatre onces de serosité parsemée de flocons purulents; en portant le doigt dans le sac le volume du testicule etoit considerable, la tunique vaginale très epaissie, ce qui determina l'operateur a ne pas passer de seton comme il est en coutume de faire tant pour ne pas augmenter l'irritation du testicule que pour retenir la suppuration dans le sac pour augmenter la fonte de la tunique vaginale; La suppuration a été etablie dans 24 heures après la seconde incision, les quatre a cinq premiers jours elle étoit melée avec de la serosité. Le malade étoit pansé avec un digestif fait avec partie egale de therebentine et de jaune d'œuf, le sac étoit injecté matin et soir avec la decoction de kina et ensuitte avec le vin miellé, une bandelette effilée couverte de digestif

etoit portée dans le fond du sac, Lorsque la suppuration a été depouillée de la serosité on s'est borné aux injections cy-dessus et a entretenir sur la fin la derniere incision ouverte avec de l'eponge preparée qu'on a abandonné le 5 avril, elle fut guerie 24 heures après. L'ulcere du cotté de l'adherence qu'on pansoit avec les memes topiques n'a été guerie que vers le vingt du même mois: Le testicule a été reduit a peu de difference près de l'etat naturel

Ce traitement nous confirme dans l'opinion qu'il suffit dans presque tous les cas de procurer une bonne suppuration aux tuniques vaginale et albuginée seule capable de procurer la cure radicale

À Toulon le 11e May 1784.

Decugis

Barberet

Hubre

Giraud Manne Boyer

Académie nationale de médecine